

# Lógica de Predicados, Semántica

Dante Zanarini

LCC

28/09/2015

# ¿Qué queremos?

- La clase pasada definimos la sintaxis de la lógica de predicados

# ¿Qué queremos?

- La clase pasada definimos la sintaxis de la lógica de predicados
- Vimos que el conjunto  $\text{FORM}$  está parametrizado por una **signatura**  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$

# ¿Qué queremos?

- La clase pasada definimos la sintaxis de la lógica de predicados
- Vimos que el conjunto  $\text{FORM}$  está parametrizado por una **signatura**  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$
- Ahora estamos interesados en darle **significado** a una fórmula en  $\text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
- Es decir, buscamos una relación  $\mathcal{M} \models \phi$ , donde  $\mathcal{M}$  es una estructura que nos permite darle significado a términos y fórmulas

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Aritmética)

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \{\bar{Z}, \bar{S}, \bar{+}, \bar{\times}\} && \text{con } \text{ar}(\bar{Z}) = 0, \text{ar}(\bar{S}) = 1, \text{ar}(\bar{+}) = \text{ar}(\bar{\times}) = 2 \\ \mathcal{P} &= \{=, \bar{<}\} && \text{con } \text{ar}(=) = \text{ar}(\bar{<}) = 2 \end{aligned}$$

# Algunos ejemplos de signaturas

## Ejemplo (Aritmética)

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= \{\bar{Z}, \bar{S}, \bar{+}, \bar{\times}\} && \text{con } \text{ar}(\bar{Z}) = 0, \text{ar}(\bar{S}) = 1, \text{ar}(\bar{+}) = \text{ar}(\bar{\times}) = 2 \\ \mathcal{P} &= \{=, \bar{<}\} && \text{con } \text{ar}(=) = \text{ar}(\bar{<}) = 2\end{aligned}$$

### Algunas fórmulas

- La constante es neutro para  $\bar{+}$ :

$$\forall x (x \bar{+} \bar{Z} = x)$$

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Aritmética)

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \{\bar{Z}, \bar{S}, \bar{+}, \bar{\times}\} && \text{con } \text{ar}(\bar{Z}) = 0, \text{ar}(\bar{S}) = 1, \text{ar}(\bar{+}) = \text{ar}(\bar{\times}) = 2 \\ \mathcal{P} &= \{=, \bar{<}\} && \text{con } \text{ar}(=) = \text{ar}(\bar{<}) = 2 \end{aligned}$$

### Algunas fórmulas

- La constante es neutro para  $\bar{+}$ :

$$\forall x (x \bar{+} \bar{Z} = x)$$

- La constante es absorvente para  $\bar{\times}$

$$\forall x (x \bar{\times} \bar{Z} = \bar{Z})$$

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Aritmética)

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \{\bar{Z}, \bar{S}, \bar{+}, \bar{\times}\} && \text{con } \text{ar}(\bar{Z}) = 0, \text{ar}(\bar{S}) = 1, \text{ar}(\bar{+}) = \text{ar}(\bar{\times}) = 2 \\ \mathcal{P} &= \{=, \bar{<}\} && \text{con } \text{ar}(=) = \text{ar}(\bar{<}) = 2 \end{aligned}$$

### Algunas fórmulas

- *La constante es neutro para  $\bar{+}$ :*

$$\forall x (x \bar{+} \bar{Z} = x)$$

- *La constante es absorvente para  $\bar{\times}$*

$$\forall x (x \bar{\times} \bar{Z} = \bar{Z})$$

- *Hay un elemento mínimo:*

$$\exists x (\forall y \neg(x = y) \rightarrow x \bar{<} y)$$



# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

# Algunos ejemplos de signaturas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

*Algunas fórmulas:*

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\epsilon} x \leftrightarrow z \bar{\epsilon} y) \rightarrow x = y)$$

# Algunos ejemplos de signaturas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\in}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\in}) = \text{ar}(=) = 2$$

*Algunas fórmulas:*

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\in} x \leftrightarrow z \bar{\in} y) \rightarrow x = y)$$

$$\overline{\text{Set}}(\bar{\emptyset}) \wedge \forall x \neg (x \in \bar{\emptyset})$$

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

Algunas fórmulas:

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\epsilon} x \leftrightarrow z \bar{\epsilon} y) \rightarrow x = y)$$

$$\overline{\text{Set}}(\bar{\emptyset}) \wedge \forall x \neg (x \in \bar{\emptyset})$$

$$\forall x \forall y \exists z (\overline{\text{Set}}(z) \wedge (\forall w w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y))$$

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

Algunas fórmulas:

- *Extensionalidad*

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\epsilon} x \leftrightarrow z \bar{\epsilon} y) \rightarrow x = y)$$

$$\overline{\text{Set}}(\bar{\emptyset}) \wedge \forall x \neg (x \in \bar{\emptyset})$$

$$\forall x \forall y \exists z (\overline{\text{Set}}(z) \wedge (\forall w w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y))$$

# Algunos ejemplos de signaturas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

Algunas fórmulas:

- *Extensionalidad*

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\epsilon} x \leftrightarrow z \bar{\epsilon} y) \rightarrow x = y)$$

- *Conjunto vacío*

$$\overline{\text{Set}}(\bar{\emptyset}) \wedge \forall x \neg (x \in \bar{\emptyset})$$

$$\forall x \forall y \exists z (\overline{\text{Set}}(z) \wedge (\forall w w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y))$$

# Algunos ejemplos de firmas

## Ejemplo (Teoría de Conjuntos)

$$\mathcal{F} = \{\bar{\emptyset}\} \quad \text{con } \text{ar}(\bar{\emptyset}) = 0$$

$$\mathcal{P} = \{\overline{\text{Set}}, \bar{\epsilon}, =\} \quad \text{con } \text{ar}(\overline{\text{Set}}) = 1, \text{ar}(\bar{\epsilon}) = \text{ar}(=) = 2$$

Algunas fórmulas:

- *Extensionalidad*

$$\forall x \forall y (\overline{\text{Set}}(x) \wedge \overline{\text{Set}}(y) \wedge (\forall z z \bar{\epsilon} x \leftrightarrow z \bar{\epsilon} y) \rightarrow x = y)$$

- *Conjunto vacío*

$$\overline{\text{Set}}(\bar{\emptyset}) \wedge \forall x \neg (x \in \bar{\emptyset})$$

- *Axioma de emparejamiento*

$$\forall x \forall y \exists z (\overline{\text{Set}}(z) \wedge (\forall w w \in z \leftrightarrow w = x \vee w = y))$$

# Interpretación de Fórmulas

- En proposicional, la interpretación (semántica) de una fórmula dependía de una **valuación**



# Interpretación de Fórmulas

- En proposicional, la interpretación (semántica) de una fórmula dependía de una **valuación**
- Esta valuación nos decía cómo interpretar los elementos atómicos de una fórmula

# Interpretación de Fórmulas

- En proposicional, la interpretación (semántica) de una fórmula dependía de una **valuación**
- Esta valuación nos decía cómo interpretar los elementos atómicos de una fórmula
- En predicados, usaremos una **interpretación** o **modelo** para darle semántica a una fórmula

# Interpretación de Fórmulas

- En proposicional, la interpretación (semántica) de una fórmula dependía de una **valuación**
- Esta valuación nos decía cómo interpretar los elementos atómicos de una fórmula
- En predicados, usaremos una **interpretación** o **modelo** para darle semántica a una fórmula
- Un modelo debe proveer significado tanto a los términos como a las fórmulas

# Modelos, definición formal

## Definición (Modelo)

Sea  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*. Un *modelo* o *interpretación*  $\mathcal{M}$  para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  consiste en:

- Un conjunto no vacío  $A$ , llamado **universo**

# Modelos, definición formal

## Definición (Modelo)

Sea  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*. Un *modelo* o *interpretación*  $\mathcal{M}$  para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  consiste en:

- Un conjunto no vacío  $A$ , llamado **universo**
- Para cada constante  $c \in \mathcal{F}$ , un elemento  $c^{\mathcal{M}} \in A$

# Modelos, definición formal

## Definición (Modelo)

Sea  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*. Un *modelo* o *interpretación*  $\mathcal{M}$  para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  consiste en:

- Un conjunto no vacío  $A$ , llamado **universo**
- Para cada constante  $c \in \mathcal{F}$ , un elemento  $c^{\mathcal{M}} \in A$
- Para cada símbolo  $f \in \mathcal{F}$  con  $\text{ar}(f) = n > 0$ , una función  $f^{\mathcal{M}} : A^n \rightarrow A$

## Definición (Modelo)

Sea  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*. Un **modelo** o **interpretación**  $\mathcal{M}$  para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  consiste en:

- Un conjunto no vacío  $A$ , llamado **universo**
- Para cada constante  $c \in \mathcal{F}$ , un elemento  $c^{\mathcal{M}} \in A$
- Para cada símbolo  $f \in \mathcal{F}$  con  $\text{ar}(f) = n > 0$ , una función  $f^{\mathcal{M}} : A^n \rightarrow A$
- Para cada símbolo de predicados  $P \in \mathcal{P}$ , un conjunto  $P^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$ . Es decir, una relación  $n$ -aria sobre  $A$ .

# Ejemplos

- Sea la signatura  $(\emptyset, \{E\})$  con  $\text{ar}(E) = 2$
- Un modelo viene dado por un conjunto  $A$  junto con una relación binaria  $E^{\mathcal{M}}$  sobre  $A$ .



# Ejemplos

- Sea la signatura  $(\emptyset, \{E\})$  con  $\text{ar}(E) = 2$
- Un modelo viene dado por un conjunto  $A$  junto con una relación binaria  $E^{\mathcal{M}}$  sobre  $A$ .
- Es decir, un modelo es un **grafo dirigido**

# Ejemplos

- Sea la signatura  $(\emptyset, \{E\})$  con  $\text{ar}(E) = 2$
- Un modelo viene dado por un conjunto  $A$  junto con una relación binaria  $E^{\mathcal{M}}$  sobre  $A$ .
- Es decir, un modelo es un **grafo dirigido**
- Por ejemplo,  $A = \{a, b, c\}$  ,  $E^{\mathcal{M}} = \{(a, b), (b, a), (c, a), (c, c)\}$
- En este modelo, nos gustaría que la fórmula

$$\phi \equiv \forall x \exists y E(x, y)$$

sea válida.

# Ejemplos

- Sea la signatura  $(\emptyset, \{E\})$  con  $\text{ar}(E) = 2$
- Un modelo viene dado por un conjunto  $A$  junto con una relación binaria  $E^{\mathcal{M}}$  sobre  $A$ .
- Es decir, un modelo es un **grafo dirigido**
- Por ejemplo,  $A = \{a, b, c\}$ ,  $E^{\mathcal{M}} = \{(a, b), (b, a), (c, a), (c, c)\}$
- En este modelo, nos gustaría que la fórmula

$$\phi \equiv \forall x \exists y E(x, y)$$

sea válida.

- Observemos que si  $E^{\mathcal{M}} = \{(a, b), (b, a), (a, c)\}$ , entonces  $\phi$  no es válida

# Ejemplos - Aritmética

- Un modelo  $\mathcal{M}$  para la aritmética:
  - ▶  $A = \mathbb{N}$ ,
  - ▶  $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
  - ▶  $\bar{S}^{\mathcal{M}}$  es tal que  $S^{\mathcal{M}}(n) = n + 1$ ,
  - ▶  $\bar{+}^{\mathcal{M}} = +$  ,  $\bar{\times}^{\mathcal{M}} = \times$
  - ▶  $\bar{=}^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a = b\}$
  - ▶  $\bar{<}^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\}$

# Ejemplos - Aritmética

- Un modelo  $\mathcal{M}$  para la aritmética:

- ▶  $A = \mathbb{N}$ ,
- ▶  $\bar{0}^{\mathcal{M}} = 0$
- ▶  $\bar{S}^{\mathcal{M}}$  es tal que  $S^{\mathcal{M}}(n) = n + 1$ ,
- ▶  $\bar{+}^{\mathcal{M}} = +$ ,  $\bar{\times}^{\mathcal{M}} = \times$
- ▶  $\bar{=}^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a = b\}$
- ▶  $\bar{<}^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\}$

- En este modelo, nos gustaría que

$$\exists x, \bar{S}(x) < x$$

no sea válida ( $\mathcal{M} \not\models \exists x, \bar{S}(x) < x$ ).

# Ejemplos - Aritmética

- Consideremos ahora el modelo  $\mathcal{M}'$  para la aritmética:
  - ▶  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,
  - ▶  $\bar{Z}^{\mathcal{M}'} = 0$
  - ▶  $\bar{S}^{\mathcal{M}'}$  es tal que  $\bar{S}^{\mathcal{M}'}(n) = (n + 1) \bmod 5$ ,
  - ▶  $a \bar{+}^{\mathcal{M}'} b = (a + b) \bmod 5$  ,  $a \bar{\times}^{\mathcal{M}'} b = (a \times b) \bmod 5$
  - ▶  $=^{\mathcal{M}'} = \left\{ (a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^2 \mid a = b \right\}$
  - ▶  $\bar{<}^{\mathcal{M}'} = \left\{ (a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^2 \mid a < b \right\}$

# Ejemplos - Aritmética

- Consideremos ahora el modelo  $\mathcal{M}'$  para la aritmética:
  - ▶  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,
  - ▶  $\bar{Z}^{\mathcal{M}'} = 0$
  - ▶  $\bar{S}^{\mathcal{M}'}$  es tal que  $\bar{S}^{\mathcal{M}'}(n) = (n + 1) \bmod 5$ ,
  - ▶  $a \bar{+}^{\mathcal{M}'} b = (a + b) \bmod 5$  ,  $a \bar{\times}^{\mathcal{M}'} b = (a \times b) \bmod 5$
  - ▶  $=^{\mathcal{M}'} = \left\{ (a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^2 \mid a = b \right\}$
  - ▶  $\bar{<}^{\mathcal{M}'} = \left\{ (a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^2 \mid a < b \right\}$
- En este modelo, nos gustaría que

$$\exists x, \bar{S}(x) < x$$

sea válida  $(\mathcal{M}' \models \exists x, \bar{S}(x) < x)$ .

# Igualdad

- Hasta ahora hemos tratado a la igualdad como un símbolo de predicados de aridad 2
- Sin embargo, es usual tratarla de un modo especial, dado que siempre tendrá la misma semántica en todos los modelos



# Igualdad

- Hasta ahora hemos tratado a la igualdad como un símbolo de predicados de aridad 2
- Sin embargo, es usual tratarla de un modo especial, dado que siempre tendrá la misma semántica en todos los modelos
- Por lo tanto, agregaremos explícitamente la siguiente regla de formación de fórmulas:
  - ▶ Si  $t, t' \in \text{TERM}$  entonces  $t = t' \in \text{FORM}$

# Igualdad

- Hasta ahora hemos tratado a la igualdad como un símbolo de predicados de aridad 2
- Sin embargo, es usual tratarla de un modo especial, dado que siempre tendrá la misma semántica en todos los modelos
- Por lo tanto, agregaremos explícitamente la siguiente regla de formación de fórmulas:
  - ▶ Si  $t, t' \in \text{TERM}$  entonces  $t = t' \in \text{FORM}$
- Además, para un modelos  $\mathcal{M}$  con universo  $A$ , definimos
  - ▶  $=^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in A^2 \mid a = b\}$


# Igualdad

- Hasta ahora hemos tratado a la igualdad como un símbolo de predicados de aridad 2
- Sin embargo, es usual tratarla de un modo especial, dado que siempre tendrá la misma semántica en todos los modelos
- Por lo tanto, agregaremos explícitamente la siguiente regla de formación de fórmulas:
  - ▶ Si  $t, t' \in \text{TERM}$  entonces  $t = t' \in \text{FORM}$
- Además, para un modelos  $\mathcal{M}$  con universo  $A$ , definimos
  - ▶  $=^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \in A^2 \mid a = b\}$
- Esto nos ahorra tener que incorporar el símbolo  $=$  en las signaturas, además de luego dar su interpretación  $=^{\mathcal{M}}$  en cada modelo.

## Más ejemplos - autómatas

- Sea la signatura  $(\mathcal{F}, \mathcal{P}) = (\{i\}, \{R, F\})$ , con  $\text{ar}(i) = 0$ ,  $\text{ar}(R) = 2$ ,  $\text{ar}(F) = 1$ .
- Un modelo  $\mathcal{M}$  para esta signatura viene dado por
  - ▶ Un conjunto  $S$  (que llamaremos estados)
  - ▶ Un elemento  $i^{\mathcal{M}}$  (estado inicial)
  - ▶ Una relación binaria  $R^{\mathcal{M}}$  (relación de transición)
  - ▶ Un subconjunto de  $S$ ,  $F^{\mathcal{M}}$  (estados finales).

Por ejemplo, un posible modelo con  $S = \{00, 01, 10, 11\}$ ,  $i^{\mathcal{M}} = 00$ :




- Valen las siguientes fórmulas en el modelo?

## Más ejemplos - autómatas

- Sea la signatura  $(\mathcal{F}, \mathcal{P}) = (\{i\}, \{R, F\})$ , con  $\text{ar}(i) = 0$ ,  $\text{ar}(R) = 2$ ,  $\text{ar}(F) = 1$ .
- Un modelo  $\mathcal{M}$  para esta signatura viene dado por
  - ▶ Un conjunto  $S$  (que llamaremos estados)
  - ▶ Un elemento  $i^{\mathcal{M}}$  (estado inicial)
  - ▶ Una relación binaria  $R^{\mathcal{M}}$  (relación de transición)
  - ▶ Un subconjunto de  $S$ ,  $F^{\mathcal{M}}$  (estados finales).

Por ejemplo, un posible modelo con  $S = \{00, 01, 10, 11\}$ ,  $i^{\mathcal{M}} = 00$ :



- Valen las siguientes fórmulas en el modelo?
  - ▶  $\forall x(R(i, x) \rightarrow \neg F(x))$
  - ▶  $\exists x R(x, x)$
  - ▶  $\exists x(R(i, x) \wedge R(x, i) \wedge \neg(i = x))$

# Validez en un modelo

- En los ejemplos, vimos que una sentencia puede ser cierta o falsa de acuerdo al modelo que consideremos para interpretarla
- Ahora intentaremos definir la idea de  $\phi$  es válida en  $\mathcal{M}$

# Validez en un modelo

- En los ejemplos, vimos que una sentencia puede ser cierta o falsa de acuerdo al modelo que consideremos para interpretarla
- Ahora intentaremos definir la idea de  $\phi$  es válida en  $\mathcal{M}$
- Para lograrlo, deberemos definir una relación más general. Sean:
  - ▶  $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
  - ▶  $\mathcal{M}$  un modelo para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  con universo  $|\mathcal{M}|$
  - ▶  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$ , que mapea variables en valores del universo

# Validez en un modelo

- En los ejemplos, vimos que una sentencia puede ser cierta o falsa de acuerdo al modelo que consideremos para interpretarla
- Ahora intentaremos definir la idea de  $\phi$  es válida en  $\mathcal{M}$
- Para lograrlo, deberemos definir una relación más general. Sean:
  - ▶  $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
  - ▶  $\mathcal{M}$  un modelo para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  con universo  $|\mathcal{M}|$
  - ▶  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$ , que mapea variables en valores del universo
- Definiremos la semántica de  $\phi$  en  $\mathcal{M}$ ,  $s$ :

$$\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} \in \{F, T\}$$



# Validez en un modelo

- En los ejemplos, vimos que una sentencia puede ser cierta o falsa de acuerdo al modelo que consideremos para interpretarla
- Ahora intentaremos definir la idea de  $\phi$  es válida en  $\mathcal{M}$
- Para lograrlo, deberemos definir una relación más general. Sean:
  - ▶  $\phi \in \text{FORM}_{(\mathcal{F}, \mathcal{P})}$
  - ▶  $\mathcal{M}$  un modelo para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$  con universo  $|\mathcal{M}|$
  - ▶  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$ , que mapea variables en valores del universo
- Definiremos la semántica de  $\phi$  en  $\mathcal{M}$ ,  $s$ :

$$\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} \in \{F, T\}$$

- ¿De dónde salió  $s$ ? ¿Es necesaria? ¿Por qué?

# Interpretación de los términos

- Para darle un significado a las *fórmulas*, debemos primero *interpretar los términos*
- Observemos que, a partir de  $s$  y  $\mathcal{M}$ , podemos asignarle un valor en  $|\mathcal{M}|$  a cada término  $t$

# Interpretación de los términos

- Para darle un significado a las *fórmulas*, debemos primero *interpretar los términos*
- Observemos que, a partir de  $s$  y  $\mathcal{M}$ , podemos asignarle un valor en  $|\mathcal{M}|$  a cada término  $t$

## Definición (Interpretación de términos)

Sea  $\mathcal{M}$  un modelo para  $(\mathcal{F}, \mathcal{P})$ , y  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$ . Definimos  $\llbracket t \rrbracket_{\mathcal{M}, s}$  por recursión en  $t$ :

$$\llbracket x_i \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = s(x_i)$$

$$\llbracket c \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = c^{\mathcal{M}} \quad \text{si } \text{ar}(c) = 0$$

$$\llbracket f(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = f^{\mathcal{M}}(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M}, s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{M}, s}) \quad \text{si } \text{ar}(f) = n > 0$$

# Interpretación de términos, ejemplos

- Consideremos la signatura para la aritmética, y el modelo visto antes con  $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ .
- Sean  $t_1 = (x_1 \bar{\bar{S}}(\bar{Z})) \bar{\times} x_2$  y  $t_2 = (\bar{S}\bar{S}(\bar{Z}) \bar{\times} \bar{S}(\bar{S}(\bar{Z})))$
- Y definimos  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$  tal que  $s(x_1) = 5$ ,  $s(x_2) = 7$ ,  $s(x_{n+2}) = 1$
- Entonces

# Interpretación de términos, ejemplos

- Consideremos la signatura para la aritmética, y el modelo visto antes con  $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ .
- Sean  $t_1 = (x_1 \bar{+} \bar{S}(\bar{Z})) \bar{\times} x_2$  y  $t_2 = (\bar{S}\bar{S}(\bar{Z}) \bar{\times} \bar{S}(\bar{S}(\bar{Z})))$
- Y definimos  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$  tal que  $s(x_1) = 5$ ,  $s(x_2) = 7$ ,  $s(x_{n+2}) = 1$
- Entonces

$$\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = 42 \text{ y } \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = 4$$

# Interpretación de términos, ejemplos

- Consideremos la signatura para la aritmética, y el modelo visto antes con  $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ .
- Sean  $t_1 = (x_1 \bar{+} \bar{S}(\bar{Z})) \bar{\times} x_2$  y  $t_2 = (\bar{S}\bar{S}(\bar{Z}) \bar{\times} \bar{S}(\bar{S}(\bar{Z})))$
- Y definimos  $s : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$  tal que  $s(x_1) = 5$ ,  $s(x_2) = 7$ ,  $s(x_{n+2}) = 1$
- Entonces

$$\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = 42 \text{ y } \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = 4$$

- Observemos que, para todas  $s, s'$ ,  $\llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s'}$ , pues  $t_2$  no tiene variables.

# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii}$$

# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$



# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$

(2) Predicados: Si  $P$  es un símbolo de predicados de aridad  $n$ ,

$$\llbracket P(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii}$$

# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$

(2) Predicados: Si  $P$  es un símbolo de predicados de aridad  $n$ ,

$$\llbracket P(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \left( \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right) \in P^{\mathcal{M}}$$

# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$

(2) Predicados: Si  $P$  es un símbolo de predicados de aridad  $n$ ,

$$\llbracket P(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad (\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{M},s}) \in P^{\mathcal{M}}$$

(3) Bottom:

$$\llbracket \perp \rrbracket_{\mathcal{M},s} = F$$

# Semántica de fórmulas atómicas

Ahora sí podemos definir  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s}$ .

(1) Igualdad:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$

(2) Predicados: Si  $P$  es un símbolo de predicados de aridad  $n$ ,

$$\llbracket P(t_1, \dots, t_n) \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad (\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \dots, \llbracket t_n \rrbracket_{\mathcal{M},s}) \in P^{\mathcal{M}}$$

(3) Bottom:

$$\llbracket \perp \rrbracket_{\mathcal{M},s} = F$$

(4) Predicados de aridad 0: Más adelante

# Conectivos

## (5) Conjunción

$$\llbracket \phi_1 \wedge \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \min \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

# Conectivos

## (5) Conjunción

$$\llbracket \phi_1 \wedge \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \min \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

## (6) Disyunción

$$\llbracket \phi_1 \vee \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \max \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

# Conectivos

## (5) Conjunción

$$\llbracket \phi_1 \wedge \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \min \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

## (6) Disyunción

$$\llbracket \phi_1 \vee \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \max \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

## (7) Negación

$$\llbracket \neg \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = F$$

# Conectivos

## (5) Conjunción

$$\llbracket \phi_1 \wedge \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \min \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

## (6) Disyunción

$$\llbracket \phi_1 \vee \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \max \left\{ \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s}, \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \right\}$$

## (7) Negación

$$\llbracket \neg \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = F$$

## (8) Implicancia

$$\llbracket \phi_1 \rightarrow \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T \quad \text{sii} \quad \llbracket \phi_1 \rrbracket_{\mathcal{M},s} \leq \llbracket \phi_2 \rrbracket_{\mathcal{M},s}$$



# Cuantificadores

## (9) Cuantificador universal:

$$\llbracket \forall x_i \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = \min \left\{ \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s[x_i \mapsto a]} \mid a \in |\mathcal{M}| \right\}$$

- Donde  $s[x_i \mapsto a] : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$  se define como:

$$s[x_i \mapsto a](x_j) = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ s(x_j) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- Es decir,  $s[x_i \mapsto a]$  es un nuevo entorno, que coincide con  $s$  en todas las variables, salvo (quizás) en  $x_i$ , donde vale  $a$ .

# Cuantificadores

## (9) Cuantificador universal:

$$\llbracket \forall x_i \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = \min \left\{ \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s[x_i \mapsto a]} \mid a \in |\mathcal{M}| \right\}$$

- Donde  $s[x_i \mapsto a] : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$  se define como:

$$s[x_i \mapsto a](x_j) = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ s(x_j) & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- Es decir,  $s[x_i \mapsto a]$  es un nuevo entorno, que coincide con  $s$  en todas las variables, salvo (quizás) en  $x_i$ , donde vale  $a$ .

## (10) Cuantificador existencial

$$\llbracket \exists x_i \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = \max \left\{ \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s[x_i \mapsto a]} \mid a \in |\mathcal{M}| \right\}$$

- Ejemplos!

# Limitando la dependencia con los entornos

## Teorema

Sean  $s, s' : \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$ . Si  $s$  y  $s'$  coinciden en todas las variables libres de  $\phi$ , entonces

$$\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s} = \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s'}$$

*Demostración: Por inducción en  $\phi$  (necesitaremos un resultado similar para términos también).*

## Corolario

Sea  $\mathcal{M}$  un modelo. Si  $\phi$  es una sentencia, entonces:

- (a) Para toda  $s$ ,  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s} = T$ , o
- (b) Para toda  $s$ ,  $\llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M},s} = F$

*Es decir, la semántica de una sentencia no depende de los entornos, sólo del modelo.*

# Validez en un modelo

## Definición

Sea  $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*,  $\phi \in \text{FORM}_{\Sigma}$ , y  $\mathcal{M}$  un *modelo* para  $\Sigma$ .  
Decimos que  $\mathcal{M}$  es un *modelo* para  $\phi$  (equivalentemente,  $\phi$  es *válida* en  $\mathcal{M}$ ), y lo notamos  $\mathcal{M} \models \phi$  sii

$$\text{Para toda } s, \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = T$$

# Validez en un modelo

## Definición

Sea  $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$  una *signatura*,  $\phi \in \text{FORM}_{\Sigma}$ , y  $\mathcal{M}$  un *modelo* para  $\Sigma$ .  
Decimos que  $\mathcal{M}$  es un *modelo* para  $\phi$  (equivalentemente,  $\phi$  es *válida* en  $\mathcal{M}$ ), y lo notamos  $\mathcal{M} \models \phi$  sii

$$\text{Para toda } s, \llbracket \phi \rrbracket_{\mathcal{M}, s} = T$$

- Si  $\Delta$  es un conjunto de sentencias, decimos que  $\mathcal{M}$  es un *modelo* de  $\Delta$  ( $\mathcal{M} \models \Delta$ ) sii  $\mathcal{M}$  es un modelo de  $\psi$ , para cada  $\psi \in \Delta$ .

# Consecuencia semántica

## Definición

Si  $\Gamma \cup \{\phi\} \subseteq \text{SENT}$ , entonces

$\Gamma \models \phi$  sii cada modelo de  $\Gamma$  es un modelo de  $\phi$

Veamos ejemplos